Pharmaco - Hypolipémiants

I. Lipides

- Dérivés **d'acides gras**, insolubles dans l'eau
- Transport dans le sang nécessitant : **protéines de transport (apoprotéines)**, enveloppé (couche de phospholipides + apoprotéine)
- Circulent dans le plasma : **lipoprotéines**
- 4 types : **chylomicrons** et **VLDL** (riche en TG) ; **LDL** et **HDL** (riche en cholestérol)

Chylomicrons	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Synthétisées par l'intestin ▪ Très riches en TG d'origine alimentaire ++ ▪ Transport des TG de l'intestin aux tissus (apport exogène en lipides) ▪ TG sont dégradés dans les tissus extra-hépatiques grâce à une hydrolyse (lipoprotéine lipase LPL) ▪ Chylomicron résiduel (remnant) subit une captation hépatique
VLDL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Synthétisées par le foie 90% ▪ Riches en TG (apport endogène en lipides) ▪ Devenir : TG dégradés par lipoprotéine lipase LPL
LDL-cholestérol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Issues des VLDL par action de la LPL ▪ Transport du CT vers les tissus (athérogène) et vers le foie ▪ Riches en apo B ▪ Si excès de LDL +++ : oxydation des LDL, dépôts artériels, athérome => Mauvais cholestérol
HDL-cholestérol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cholestérol provenant des cellules ou en excès après action LPL ▪ Riches en Apo A ▪ Transprot « reverse » vers le foie (non athérogène) et élimination => Bon cholestérol

Métabolisme des lipoprotéines : endogène et exogène

II. Dyslipidémies

Classification de Fredrickson :

Type I	Hyperchylomicronémie (rare)	Augmentation chylomicrons Augmentation TG
Type IIa	Hypercholestérolémie pure	LDL élevé
Type IIb	Hypercholestérolémie mixte	Augmentation VLDL, LDL/HDL élevés + TG élevés
Type III	Hypercholestérolémie essentielle (rare) état homozygote Apo E	Augmentation béta-VLDL
Type IV	Hypertryglycéridémie pure	Augmentation VLDL, TG élevés

- Mesure du LDL-cholestérol :
LCL-C (g/l) = CT – HDL – TG/5 (seulement si TG < 4g/l)
- Bilan lipidique normal :
 - LDL-CT < 1,6 g/l
 - Triglycérides < 1,5 g/l
 - HDL-CT > 0,4 g/l
- Prise en charge de la dyslipidémie : prise en charge diététique +++, exercice physique puis Tt médicamenteux (statines, inhibiteurs de la HMG CoA-réductase, fibrates, résines échangeuses d'ions, inhibiteurs de absorption intestinale, autres)

III. Médicaments hypolipémiants

Statines ou inhibiteurs de la HMG CoA-réductase

- xxx-**vastatine**
- Médocs : **Simvastatine** (Lodales®, Zocor®), **pravastatine** (Elisor®, Vasten®), **atorvastatine** (Tahor®), **Fluvastatine** (Fractal®, Ilescol®), **rosuvastatine** (Crestor®)
- Mécanisme d'action : **inhibition** (compétitive) de la **biosynthèse du cholestérol** dans le foie => inhibition de la synthèse intracellulaire du cholestérol, stimulation de l'activité des récepteurs LDL, augmentation de la capture des LDL par hépatocytes
- Pharmacocinétique :

Paramètres	Atorvastatine	Fluvastatine	Lovastatine	Pravastatine	Rosuvastatine	Simvastatine
Prodrogue	non	non	oui	non	non	oui
Biodisponibilité (%)	12	24	5	18	20	5
Liaison protéique (%)	98	>98	>95	50	90	95-98
Demi-vie (h)	14	1.2	3	1.8	19	2
Métabolites actifs	oui	non	oui	non	-	oui
Isoenzymes CYP 450	3A4	2C9	3A4	-	-	3A4
Élimination rénale (%)	<5	6	10	20	10	13

- Effet de 1^{er} passage hépatique

- Élimination surtout biliaire
- Réduction **dose-dépendante** du taux des LDL
- Autres effets : légère baisse des TG, augmentation de 5-15% HDL
- Indications principales :
 - **Efficacité** +++ = Tt de choix de **hypercholestérolémie** pure ou mixte (*Attention : non efficace si hypercholestérolémie familiale homozygote*)
 - Prévention **primaire hyper-Ct** pures ou mixtes
 - Prévention **secondaire de pathologie CV athéromateuse** : post-IDM, AVC, artériopathie des membres inférieurs
 - **Diabète de type II**
- Effets indésirables :
 - **Toxicité musculaire** : myalgies fréquentes, myopathie, rhabdomyolyse exceptionnelle (favorisée par insuffisance rénale ou association aux inhibiteurs CYP3A4)
 - **Toxicité hépatique**
 - **Diabète de type 2**
 - **Arthralgies, trb digestifs** (constipation, nausées)
 - Fréquence des effets indésirables est dépendante de la dose
- Contre-indications :
 - **Grossesse et allaitement**
 - **Hypersensibilité** à l'u des constituants
 - **Affection hépatique évolutive**
- Précautions d'emploi : association aux fibrates (rhabdomyolyse), association aux inhibiteurs du CYP3A4, insuffisance rénale, association aux AVK

Fibrates :

- Mécanisme d'action : **stimule la lipolyse** par activation des récepteurs nucléaires PPAR α => **diminution TG** (par augmentation de l'activité de la LPL) et **augmentation HDL** (par synthèse des protéines majeures de HDL : ApoA1 et A2)

- Médicaments :

Gemfibrozil (Lipur®)

Bezafibrate (Befizal®)

Fenofibrate (Lipanthyl®)

Ciprofibrate (Lipanor®)

- Pharmacocinétique :

- **Forte liaison aux protéines plasmatiques** : augmentation de l'effet des AVK
- **Élimination** surtout rénale

- Indications : **hypertryglycéridémies, hyper-cholestérolémie** (en 2^{ème} intention)

- Effets indésirables :

- **Trb gastro-intestinaux**
- **Myalgies** et augmentation CPK : **rhabdomyolyse** ++ (favorisée par IRénale et association aux statines)
- **Augmentation transaminases**
- **Lithiases biliaires**
- **Allergie cutanée**

- Contre-indications :

- **Insuffisance rénale ou hépatique sévères**

- **Lithiase biliaire**
- **Grossesse et allaitement**
- Interactions médicamenteuses :
 - Pas d'association avec une **statine**
 - Eviter associations avec des **médicaments potentiellement hépatotoxiques**

Résines échangeuses d'anions

- **Colestyramine : Questran®** : résine chélatrice des acides biliaires
- Mécanisme d'action : échange des ions chlore pour des acides biliaires dans le tractus intestinal :
 - Empêche réabsorption des acides biliaires, diminue cycle entéro-hépatique des AB
 - Diminue le cholestérol total => augmentation du nombre des LDLR, induit augmentation de captation LDL par hépatocytes => diminution concentrations plasmatiques en LDL
- Indication : **hypercholestérolémie** isolée en 2^{ème} intention, +/- association à statine
- Efficacité : diminution 15-25% CT et LDL, Augmente TG en début de Tt, HDL inchangé
- Effets indésirables :
 - **Trb gastro-intestinaux** (douleur, constipation, ballonnement, syndrome pseudo-occlusif)
 - Tt prolongé **risque de carence en vitamines liposolubles** (K, D, A, E)
- Interactions médicamenteuses :
 - Réduction de la résorption intestinale de **AVK**
 - Réduction possible de résorption intestinale d'autres médicaments (thiazidiques, digitaliques, phénobarbital...)

→ Si association médicamenteuse : administrer 1h avant ou 2h après la prise de colestyramine

IV. Inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol

Ezetimibe (Ezetrol®)

- Mécanisme d'action : **Inhibition sélective de absorption intestinale** du cholestérol alimentaire, cholestérol biliaire et phytostérol
- Indications :
 - **Hypercholestérolémie** en 2^{nde} intention : association avec statine ou monothérapie si statine mal tolérée
 - **Hypercholestérolémie familiale homozygote**
- Pharmacocinétique : cycle entéro-hépatique
 - Résorption digestive rapide
 - **Liaison** protéine plasmatique
 - **Glycuro-conjugaison** intestinale et hépatique
 - Elimination **biliaire** (80%) et urinaire
- Effets indésirables :
 - **Trb digestifs** (diarrhée, constipation, flatulence)
 - **Elévation des transaminases** (3N) surtout en association aux statines
 - **Elévation CPK**
 - **Myalgies**

V. Nouvelles thérapeutiques ciblant PCSK9 ?

Rôle de Proprotéin convertase subtilisin/kexin-9 (PCSK9) dans la régulation de l'expression du LDL récepteur

VI. Hypolipémiant et dyslipidémie

- Dyslipidémie : anomalie quantitative ou qualitative d'un ou plusieurs lipides plasmatiques, très fréquentes ++ => Tt diététiques + exercice
- Si nécessité de Tt médicamenteux : **Statine** +++ sauf 3 cas : intolérance aux statines, LDL-CT < 1g/l associé à des TG élevés et HDL bas, hypertryglycémie sévère isolée (TG > 4g/l)
- Prise en charge hygiéno-diététique : arrêt alcool, arrêt tabac, régime alimentaire (*limitation d'apports en cides gras saturés, augmentation de consommation de légumes, fruits et produits céréaliers, limiter le cholestérol alimentaire*), corriger le surpoids, éviter le sédentarisme, contrôler tous les FdR cardiovasculaires
- Tt par statine :
 - **Contrôle de transaminases** dans les 3 mois
 - Si symptôme musculaire inexpliqué sous statine => **dosage CPK**
 - Attention interactions médicamenteuses : CYP3A4
- Réduction LDL-cholestérol sérique = meilleur indicateur d'efficacité de la prévention cardiovasculaire par les hypolipémiants