TUBERCULOSE (LAME 4)

« Ganglion lymphatique avec inflammation granulomateuse (épithélioïde et gigantocellulaire) avec nécrose caséeuse »

Ganglion normal
Organe plein, arrondi,
Limité par une capsule, en-dessous de laquelle on retrouve le sinus sous-capsulaire.
Cortex ganglionnaire composé de follicules lymphoïdes, dont certains sont à centres clairs.
Zone paracorticale.
Médullaire ganglionnaire.
Sur une lame, rechercher capsule, sinus sous-capsulaire et follicules lymphoïdes.

Débris cellulaires. On ne peut ni reconnaître de tissu ni de cellules particulières.



Plages de nécrose caséeuse
(cernées par ¢ épithélioïdes)





2°) ***Granulome tuberculoïde***
- *Formé de **cellules épithélioïdes éosinophiles** avec noyau ovoïde ou en « semelle de chaussure » + **cellules géantes multinucléées** avec noyaux en couronne (cellules de type Langhans)*
- *Peut être centré par de la **nécrose caséeuse**.*
- *Cerné en périphérie par de la fibrose collagénique et des lymphocytes (± plasmocytes).*



1°) Est-ce que c'est un ganglion ? Aller checker en périphérie

À faible grossissement, on perçoit déjà des plages de nécrose caséeuse, éosinophiles, « en carte de géographie ».