Conf n°3 – PF, Vertiges, Fractures du rocher

I - PF

a – CAT devant une PF

- Nerf facial => 2e arc ou arc hyoïdien
- Dev de la musculature faciale (anat compliquée car oreille moyenne)
- Bien distinguer les voies périph et centrales ++

Fibres :

- Fibres motrices : tous les muscles de la face sauf le releveur de la paupière + muscles de l'étrier (stylo-hyoïdien, ventre post du digastrique)
- Fibres sécrétoires parasympathiques : glande lacrymale
- Fibres sensibles : zone de Ramsey-Hunt (conque + CAE)
- Fibres sensorielles : goût des 2/3 ant de la langue

Afférences du noyau facial :

- faisceau cortico-nucléaire
 - PF centrale : respect du territoire supérieur
- système extra-pyramidal (SDR Parkinson => amimie)
 - PF centrale : dissociation automatico-volontaire (pas de motricité volontaire mais motricité automatique et émotionnelle conservé)
- (formation réticulée)
- réflexes impliquant le nerf facial

/!\ ½ sup de la face => innervation qui vient des 2 cortex, par ex : si hémiplegie G, paralysie de la moitié sup de la face, la moitié inf non atteinte

½ inf = innervation classique (fibres qui croisent : partie G commandée par le cortex D)

Classification de House et Brackmann

- Grade I : normal
- Grade II : presque normal
- Grade III : fermeture de l'œil avec effort
- Grade IV : pas de fermeture de l'œil mais face tonique et globalement symétrique
- Grade V : hypotonie marquée, presque rien
- Grade VI : rien ne marche
- Si syncinésies et ou contracture grade III ou IV

Syncinésies : mvts parasites (séquelles) ex : occlusion palpébrale si on demande de gonfler les joues...

Signe de Charles Bell : œil qui bascule qd le patient tente de fermer l'oeil paralysé

Réinnervation de la face paralysée :

- réparation directe du nerf facial (dans l'année)
- anastomose hétéro-nerveuse (nerf hypoglosse, axones qui repoussent dans le nerf facial)
- suspensions actives (myoplastie d'allongement du muscle temporal, innervé par le V pour redonner un sourire)
- TTT de la lagophtalmie

b – Diagnostic

- Interrogatoire : ATCD, date et contexte de survenue, signes accompagnant
- Examen clinique : classification de la PF, examen ORL et neuro (paires crâniennes)
- EMG faciale
 - de stimulation : déduction de la perte axonale en comparaison avec le côté sain
 - de détection : potentiel de dénervation, de réinnervation, syncinésies
- Test de Schirmer (test de la fct lacrymale), Audiométrie, reflexes stapédiens
 - permettent de localiser la lésion sur le nerf (nerf pour glandes lacrymales = ganglion géniculé, innervation stapédienne = portion mastoïdienne)
- TDM en coupes fines du rocher
- IRM injecté ++++++
- Eléments pronostics :
 - étiologie
 - examen clinique : testing musculaire, selon House-Brackmann
 - EMG : type de lésion nerveuse

c – PF idiopathique (a frigore, de Bell)

80% des PF

Conneries à ne pas dire au patient :

- c'est forcément une PF a frigore
- le scanner est normal c'est rassurant
- c'est pas grave y aura plus rien dans 15j
- mangez des chewing gum et faites des grimaces (fav ++++ les complications)

Réactivation d'HSV1

Début brutal qui peut se compléter en 48h

Prodromes : otalgie, paresthésies faciales, dysgeusie, céphalées, fièvre, hyperacousie douloureuse
Examen normal en dehors de la PF qu'il faut grader

Evolution naturelle : régression, précoce ou tardive

A terme : 70% de guérison (donc 30% de séquelles, dont la moitié de graves)

Diag : PF périphérique de début brutal isolée et spontanément régressive

IRM : à faire sans urgence

Pronostic : grade clinique, intensité et précocité de la perte axonale (EMG à J10)

- 50% de perte axonale = 50% de chances de complications

TTT :

- corticothérapie
- aciclovir
- protection oculaire ++++
- rééducation (mais mieux vaut pas de rééducation qu'une rééducation mal faite)
- décompression chirurgicale (rare)
- TTT des séquelles par toxine botulique
 - TTT du spasme et des suncinésies ++
 - protection de la cornée par injection dans le releveur
 - symétrisation du visage par injection du côté sain (on paralyse les 2 cotés...)

d – SDR de Ramsay-Hunt

Zona du GG géniculé

Otalgie importante, éruptions vésiculeuses au niveau de la conque

SDR vestibulaire (= diag diff avec la PF idiopathique)

e – autres PF infectieuses

- Lyme (PF a la phase IIr ou IIIr de la maladie, diag difficile)
- VIH (primo-infection, donc avant que la sérologie soit positive)
 - séro VIH systématique dans le bilan étio des PF
- Rougeole, Tétanos

f – PF tumorales +++++

NE PAS PASSER A COTE → IRM +++

- PF d'évolution progressive +++ (!\ une installation brutale n'élimine pas le diag) + signes fonctionnels du site de la tumeur (valeur localisatrice du test de Schirmer et réflexe stapédien)
- Schwannome du VII : sur tout le trajet du nerf mais le site le + fréquent est le GG géniculé
 - atteinte du nerf a type de paralysie ou d'hémispasme, signes cochléaires ou vestibulaires
 - diag : IRM, TDM du rocher
 - TTT : abstention, chir
- Tumeurs tu tronc cérébral, de l'angle ponto-cérébelleux,
- Tumeurs du rocher : hémangiome, cholestéatome
- Tumeurs de la glande parotide

g – PF traumatiques

- Fracture du rocher : PF d'emblée ou secondaire, signes de localisation, grading et EMG apprécient le pronostic => TDM du rocher
- Plaies de la face au niveau de la région parotidienne
- Post-chir (les plus fréquentes)
 - chir parotidienne : PF bénignes sauf section nerf ou branche
 - chir de l'oreille : mécanisme ?
 - Raisonner comme dans une fracture du rocher
 - chir de l'angle pontocérébelleux : état physio et anat du nerf en fin d'intervention

h – Autres

- PF otitiques :
 - otite maligne externe :
 - otite externe chez un sujet âgé diabétique
 - infection à *P. Aeruginosa*
 - mortelle si pas correctement traitée (corticothérapie)
 - Otite moyenne aigue
 - Otite moyenne chronique (cholestéatome)
- Maladies générales :
 - diabète
 - sarcoïdose
 - maladie de Wegener
- Affections neurologiques :
 - AVC (souvent PF centrale, mais si atteinte ischémique du tronc cérébral => SDR alterne = hémiparésie d'un côté, PF (atteinte du nerf) de l'autre)
 - SDR de Guillain Barre
 - Trauma chir
 - Tumeurs
 - SEP (à cause du trajet des fibres dans la substance blanche, peut révéler la SEP)

i – PF centrale

Atteinte supra-nucléaire

Territoire inférieur, conservation d'une motricité automatique et émotionnelle

Signes neuro associés

AVC, tumeurs, maladie dégénérative

IRM +++

II – Vertiges

a – Bases physio

- Def :
 - sensation de mouvement rotatoire soit de l'environnement soit du sujet lui meme
 - troubles de l'équilibre
 - 3 capteurs d'information :
 1. Système vestibulaire
 - capteurs périphériques : 6 ampoules des canaux semi-circulaires, 2 macules utriculaires et 2 macules sacculaires
 - voies nerveuses péripih : nerfs vestibulaires sup et inf
 - centres : moyaux vestibulaires du TC intégrant les infos
 - effecteurs : système vestibulo-spinal, système vestibulo-oculaire
 2. Vision
 3. Proprioception
- => puis intégration centrale

Système plurimodal de stabilisation statique et dynamique de la posture et de la vision
Efférences musculaires

b – interrogatoire

- ATCD
- Description du trouble : mvt rotatoire, linéaire, chute ou déviation de la marche, instabilité
- Ancienneté et mode d'installation
- Mode évolutif
- Fréquence et durée
- Circonstances déclenchantes : position, stress, effort, obscurité (on supprime l'information visuelle → dépistage du SDR vestibulaire), épisodes hormonaux, variations pressionnelles
- Signes d'accompagnement ++
 - dig et généraux (sensation de malaise, nausées, vomissements) ++, auditifs, neuro, visuels, céphalées
- l'interrogatoire élimine les faux vertiges et permet souvent de faire le diagnostic

c – Examens

- ORL, neuro, général
- Examen vestibulaire : en supprimant l'information visuelle
 - recherche d'un nystagmus (mvt lent puis saccade de recentrage, sens du nystagmus = sens de la saccade)
 - recherche d'une déviation segmentaire : signe de Romberg, épreuve des index, marche en étoile de Babinski, test de Fukuda
 - distinguer SDR harmonieux périphérique (tous les signes du même côté) du SDR dysharmonieux central
- Examens complémentaires :
 - audiométrie tonale, vocale
 - examen vestibulaire calorique (explore le canal latéral, eau chaude et froide ds l'oreille) et VHIT

- potentiels évoqués otolithiques
- equitest : sépare les différents systèmes qui participent à l'équilibre
- fondamental : IRM +++++

d – Faux vertiges

- vertige des hauteurs
- vertige psychogène : agoraphobie, attaque de panique
- vertiges circulatoires : hypotension orthostatique, lipothymies, hématologiques
- hypoglycémie
- trouble de la marche sans sensation vertigineuse

e – Vertiges labyrinthiques

Vertiges labyrinthiques

- Vertige paroxystique bénin de position
- Maladie de Ménière
- Traumatismes du rocher : fracture du rocher, fistule péri lymphatique
- Déhiscence canal supérieur SD de Minor
- Infections
- Médicaments ototoxiques
- Tumeurs du rocher
- Otospongiose
- Cinétoses
- Vertige alcoolique
- Omission vestibulaire

f – Vertige paroxystique bénin de position (VPBP)

- Le + fréquent
 - Cupulolithiase du canal postérieur => Vertige bref en position couchée ou lors du lever
 - Pas de signes cochléaires (pas d'acouphènes ni surdité)
 - Examens vestibulaires normaux
 - Manœuvre de Dix et Hallpike :
 - patient assis et on le met brutalement d'un côté et de l'autre => dépiste le côté de l'atteinte
 - Manœuvre libératoire
 - qd on a le côté, on le met brutalement de l'autre côté pour faire migrer les lithiases coincées dans le canal post qui retournent dans la cochlée
- => pas de médicaments, pas d'examens compliqués

g – Maladie de Ménière

- Hyperpression des liquides endolabyrinthiques
- Evolue par crises associant vertiges, acouphènes et surdité
 - sensation de plénitude dans l'oreille ± douleur, acouphènes et grand vertige
 - épisodes fav par le stress/surmenage
- Surdité prédomine sur les graves, et progresse au cours de la maladie, d'abord unilat puis bilat
- Vertige de Lermoyez
- Phénomène de Tumarkin (crise otolithique) patient qui est assis et qui est brutalement projeté

- TTT :
 - de la crise : atnivertigineux (tanganil) + sédatifs, antihémétiques, repos
 - de fond : histaminergiques, règles hygiénodietétiques
 - traitements destructifs si gêne +++

h – Vertiges par atteinte des voies nerveuses périphériques

- Tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux (à ne pas méconnaître ++)
- Conflits vasculaires
- Névrite vestibulaire :
 - début brutal sans circonstances déclenchantes
 - grande crise très invalidante
 - pas de signes cochléaires (diag diff avec la maladie de Ménière)
 - examen neuro normal
 - aréflexie vestibulaire calorique
 - TTT med : antivertigineux, cortisone (car inflammation)
 - évolution vers la compensation ou le retour à la normale

i – Vertiges centraux

- AVC :
 - SDR de Wallenberg
 - Ischémie cérébelleuse
 - AVC ischémiques transitoires
- Tumeurs du TC
- Migraines
- SEP :
 - grand vertige inaugural dans 10% des cas
 - trouble de l'équilibre
 - rechercher un nystagmus dysconjugué qui trad l'ophtalmoplégie inter-nucléaire (releve d'un spécialiste)
 - hyperréflexie vestibulaire calorique
 - IRM : hypersignaux en T2

/!\ Vertige + signes neurologiques = URGENCE !!

III – Fracture du rocher

a – Généralités

- Pathologie fréquente en urgence
- Trauma craniens
- Examen clinique ++
- Audition, équilibre, nerf facial atteints

- Priorité = prise en charge du trauma cranién MAIS recherche des signes cliniques en faveur d'une atteinte pétreuse :
 - Otorragie
 - Otoliquorrhée
 - PF
 - Surdit (Test de Weber)
 - Vertige

- Examens complmentaires :
 - Audiogramme
 - Examen vestibulaire calorique
 - EMG facial
 - TDM du rocher en coupes fines
 - Fractures transversales plus graves

Fractures longitudinales

Fractures transversales

b – Lsions

- Lsions labyrinthiques :
 - surdit de perception dfinitive
 - Acouphnes
 - destruction vestibulaire
 - fistule prilymphatique (fuite de LCR => surdit fluctuante et petits vertiges)
 - vertige paroxystique bnin

- Lsions tympanoossiculaires :
 - perforation tympanique
 - luxation ossiculaire
 - fracture ossiculaire

- Lésions ostéodurales :
 - otoliquorrhée
 - hernies méningées ou cérébrales
 - /!\ En général, les fuites de LCR se résorbent toutes seules, mais fuite de LCR = risque de méningite à Pneumocoque ++ (risque vital)
 - Tte fuite de LCR = vaccination anti-pneumocoque du patient !!

- PF :
 - Important : apparue d'emblée ou secondairement ?
 - Intensité clinique
 - perte axonale
 - données TDM (loc)
 - indication large de la chir exploratrice en raison du risque de séquelles invalidantes