STAGE DE PRÉ-RENTRÉE (SPR)

Matière : Biochimie

Cours du jour : Structures et fonction des protéines

Date du cours : Août 2021

Un diapo du
Tutorat Santé PSA

Mais déjà, ça sert à quoi une protéine?

- Créer et maintenir une structure
- Reconnaître et se défendre
- Transporter

- Transformer
- Bouger -se déplacer
- Informer -signaler

❖ Les protéines assurent l'ensemble des fonctions du vivant!

Plan du cours

1. Structure des protéines : de l'acide aminé à la macromolécule

- a. Les acides aminés
- b. La liaison peptidique
- c. Extrémités N et C-terminale
- d. Clivage
- e. Structure
- f. Point isoélectrique

2. Fonctions des protéines : l'exemple du transport de l'oxygène

- a. Myoglobine
- b. Hémoglobine
- c. Saturation

1. Structure des protéines

a. Les acides aminés

- ❖ constituants des protéines
- ❖ **20** acides aminés naturels :

- ❖ un carbone **asymétrique** central
- ❖ une fonction **acide carboxylique**
- ❖ une fonction **amine primaire**
- ❖ une chaîne **variable R**

1. Structure des protéines

a. Les acides aminés

- ❖ Le carbone α est **asymétrique**
- ❖ Il existe donc 2 stéréo-isomères possibles:
 - **L**-acide aminé
 - **D**-acide aminé
- ❖ protéines naturelles :

forme L

1. Structure des protéines

a. Les acides aminés

Notes :

- ❖ La **glycine** n'a pas de **Carbone asymétrique**.
- ❖ La **Proline** n'a pas de fonction **Amine primaire**

Glycine

Proline

Acides aminés apolaires à chaîne aliphatique

Glycine

le carbone α
n'est pas
asymétrique!

Méthionine

→ possède un
atome de
Soufre
→ donneur de
méthyl

Proline

→ chaîne latérale
liée à la fois au
carbone α et à
l'azote

3 acides aminés à chaîne latérale aromatique

Phénylalanine

Tyrosine

Tryptophane

Cycle phényl

Cycle indol

3 acides aminés à fonction alcool

Sérine

Thréonine

Tyrosine

NB:

Les fonctions alcools peuvent être **phosphorylées** par des kinases (fixation d'un groupement phosphate)

=> **régulation** de la fonction d'une protéine!

Acides aminés polaires neutres

Fonction thiol

Oxydation de deux cystéines
=> **pont disulfure (S-S)**

Dans les glycoprotéines, les **oses** se fixent sur **l'atome d'azote** de la fonction amide de la chaîne latérale de l'asparagine: c'est la **N-glycosylation!**

Acides aminés polaires ionisables à fonction acide

Acide aspartique

pKa (R) = 3,9

Acide glutamique

pKa (R) = 4,1

Négatif à pH 7

Acides aminés polaires ionisables à fonction basique

Histidine

pKa (R) = 6,0

Lysine

pKa (R) = 10,5

Arginine

pKa (R) = 12,5

Positifs à pH 7

Faiblement basique

(majoritairement **neutre** à pH 7)

certain caractère aromatique

Pourquoi certains AA sont chargés + ou - ?

13

Exemple de l'histidine (basique)

Diagramme de prédominance de l'histidine

L'histidine est dite **faiblement basique** car elle n'est majoritairement positive qu'en dessous de pH 6, ce qui est très peu courant physiologiquement

Pour cela qu'on dit que **l'histidine est majoritairement neutre à pH 7**

1. Structure des protéines

b. La liaison peptidique

- ❖ acides aminés liés entre eux par des **liaisons** dites **peptidiques** :
 - Entre COOH et NH₂
- ❖ La liaison peptidique est une **liaison amide particulière**.

- ❖ elle est :
 - **PLANE**
 - **RIGIDE**

1. Structure des protéines

b. La liaison peptidique

$\Omega = 0^\circ$? **CIS**

$\Omega = 180^\circ$? **TRANS**

- ❖ Ω = angle de torsion autour de la liaison C-N.
- ❖ 2 valeurs : 0° ou 180°

Pour des raisons de stabilité, il prend presque toujours la valeur de 180° , donc la configuration TRANS.

1. Structure des protéines

C. Extrémités N et C-terminale

- ❖ Une protéine = succession d'acides aminés et de liaisons peptidiques.
- ❖ Il y a donc :
 - un côté avec une fonction **amine** libre, appelé **extrémité N-terminale**
 - un côté avec une fonction **acide**, appelé **extrémité C-terminale**.
- ❖ Par convention, une chaîne polypeptidique :
 - **commence** par le côté **N-term**
 - **Se termine** par le côté **C-term**.

1. Structure des protéines

d. Clivage

❖ Clivage enzymatique

- **Trypsine**: coupe après (côté C-terminal) les résidus :

1. Lysine
2. Arginine

- **Chymotrypsine**: coupe après un résidu de

1. Phénylalanine
2. Tyrosine
3. Tryptophane
4. Leucine
5. Méthionine

❖ Clivage chimique

- **Bromure de cyanogène**: coupe après un résidu de méthionine.

Molécule de trypsine

1. Structure des protéines

e. La structure

❖ Les 4 niveaux de structures

- **Structure primaire** :

- Enchaînement des acides aminés – appelée séquence

- **Structure secondaire** :

- Motifs simples – donne forme à la protéine – exemples : hélices/coudes

- **Structure tertiaire** :

- Agencement d'un monomère (=une séquence d'acides aminés) dans l'espace

- **Structure quaternaire** :

- Agencement des protéines polymériques

1. Structure des protéines

f. Le point isoélectrique

- charges **positives** et **négatives** au niveau des chaînes latérales
 - dépendent du pH
- => somme algébrique définit la **charge globale** de la protéine.

ACIDES

Acide
aspartique

Acide
glutamique

Histidine

BASES

Lysine

Arginine

- ❖ Il existe toujours un pH pour lequel :
 - le nombre de charges positives = le nombre de charges négatives : **charge globale => nulle.**
- ❖ Ce pH s'appelle le **point isoélectrique** de la protéine (pI).

2. Fonction des protéines

a. La myoglobine

❖ La myoglobine est une protéine :

- **Monomérique**
- **structure compacte**
- **riche en hélices α**
- Utile (😊) *sinon on est morts haha lol*

+ **groupement prosthétique** (*groupement non peptidique appartenant à une protéine*) nommé **hème**.

hème

2. Fonction des protéines

a. La myoglobine

- ❖ L'hème permet de lier une molécule d'O₂ grâce à son **atome de Fer** au milieu.
- ❖ **Stocker l'O₂ dans les muscles** (très forte affinité)

2. Fonction des protéines

b. L'Hémoglobine

4 monomères => **tétramère**

Les monomères qui la constitue ressemblent fortement à la myoglobine.

Deux sous-unités α et deux sous-unités β liées par des liaisons faibles (non covalentes).

Chacune de ses sous-unités peut lier une molécule d' O_2 : **au total l'hémoglobine peut donc en lier 4**

Affinité de l'hémoglobine = variable

=> phénomène de coopérativité : l'hémoglobine est une protéine **allostérique**

- L'hémoglobine comme la myoglobine sert à **lier l' O_2** , mais elle est présente **dans le sang**, et plus que son stockage, elle sert **surtout à son transport**.

2. Fonction des protéines

c. Saturation

❖ Courbe de la **myoglobine** :
hyperbole
=> très forte affinité pour O_2

Relâche son O_2 que lorsque la pO_2 est très faible (muscle lors d'un exercice violent par exemple)

● Courbe de l'**hémoglobine** :
sigmoïde
=> affinité augmente avec la saturation

Affinité très élevée dans les poumons (pO_2 élevée) => lier +++ l' O_2

affinité faible dans les muscles (pO_2 est faible) => relâcher l' O_2

=> excellent transporteur

Effet Bohr

- ❖ Mis en jeu lors de :
 - Augmentation de $[CO_2]$
 - Augmentation de $[H^+]$, donc **diminution du pH**
- => Ce sont les conditions dans le muscle à l'effort

- ❖ Il entraîne un déplacement de la courbe de saturation vers la droite

Courage pour la suite les loulous

Prochaine séance : Cours sur les
GLUCIDES/LIPIDES!